

poste avancé de la Compagnie des pelleteries de la baie d'Hudson. C'est de là qu'au printemps l'expédition continuera ses opérations, en se dirigeant sur la chaîne des Montagnes-Rocheuses.

M. Cosson, secrétaire, présente plusieurs plantes rares, recueillies par M. Eloy de Vicq dans les départements de la Somme et du Pas-de-Calais, et donne lecture de la communication suivante, adressée à la Société :

NOTES SUR QUELQUES PLANTES DU LITTORAL DES DÉPARTEMENTS DE LA SOMME  
ET DU PAS-DE-CALAIS, par M. ELOY DE VICQ.

(Paris, 18 décembre 1857.)

**Cochlearia danica** L. *Sp.* 903; Boucher, *Cat. fl. d'Abbev.* [1803]; Pauquy, *Fl. de la Somme*, 47; Gr. et Godr. *Fl. de Fr.* I, 128; Puel et Maille, *Herb. fl. loc.* n° 168.—La première station de cette espèce dans la Somme est celle des dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont. Je l'ai récoltée aussi à Étapes (Pas-de-Calais) et vers le cap Gris-Nez. Nous ne trouvons pas le *C. anglica* L.

**Crambe maritima** L. *Sp.* 937; Boucher, *Cat. fl. d'Abbev.* [1803]; Pauquy, *Fl. de la Somme*, 40; Gr. et Godr. *Fl. de Fr.* I, 157. — Cette plante, commune à Criel (Seine-Inférieure), se trouve aussi entre le Tréport et Mers et sur le banc de galets entre le bourg d'Ault et le Hourdel (Somme).

**Viola sabulosa** Boreau, *Not. pl. Fr.*, in Bull. Soc. ind. Angers, ann. 24, n° 6, p. 335 [1853]; Puel et Maille, *Herb. fl. loc.* n° 249 (*V. tricolor* Boucher, *Cat. fl. d'Abbev.* [1803]); distinct du *V. tricolor* var. *sabulosa* DC. par ses pétales beaucoup plus longs que le calice. — Cette espèce ou variété, remarquée par M. Tillette de Clermont, est très répandue dans les dunes du littoral.

**Pisum maritimum** L. *Sp.* 1027; Boucher, *Cat. fl. d'Abbev.* [1803]; DC. *Fl. fr.* IV, 585; Pauquy, *Fl. de la Somme*, 102 (*Lathyrus maritimus* Fries; Gr. et Godr. *Fl. de Fr.* I, 486; Puel et Maille, *Herb. fl. loc.* n° 145.—Signalé pour la première fois en 1803 par Boucher (et d'après lui par De Candolle et par Pauquy), au Hourdel, commune de Cayeux (Somme), dans les galets près de la mer. J'ai rencontré en 1853 un pied de cette plante sur la digue de galets entre le Tréport et Mers; depuis il a disparu. Il en existe, près du fort de Mers, deux autres pieds qui proviennent de graines que j'y ai semées en 1853.

**Cineraria palustris** L. *Sp.* 1243; Boucher, *Cat. fl. d'Abbev.* [1803]; Pauquy, *Fl. de la Somme*, 200 (*Senecio palustris* DC.; Gr. et Godr. *Fl. de Fr.* II, 124; Puel et Maille, *Herb. fl. loc.* n° 162). — Marais de Saint-

Quentin-en-Tourmont, Étaples, Condette près Boulogne. Cette plante qui, d'après des notes manuscrites de Dumaisniel de Belleval, existait en 1775 dans les fossés auprès d'Abbeville, a disparu depuis longtemps de cette localité, ainsi que le *Lysimachia thyrsiflora* L. qui a été détruit par suite des travaux des fortifications.

— **Pyrola rotundifolia** L. var. *arenaria* Koch; Gr. et Godr. *Fl. de Fr.* II, 437; Puel et Maille, *Herb. fl. loc.* n° 157. — Cette variété est très commune dans toutes les dunes, où elle vient à l'abri de l'*Hippophaë rhamnoides*.

**Erythraea littoralis** Fries, *Nov. fl. suec.* ed. 1, p. 29; *Fl. dan.* tab. 1814; Puel et Maille, *Herb. des fl. loc.* n° 212. — Cette espèce, découverte par M. Tillette de Clermont, appartient aux dunes. Je l'ai rencontrée depuis Saint-Quentin-en-Tourmont jusqu'à Ambleteuse.

**Gentiana amarella** L.; Koch. — Cette plante, indiquée par M. J. Gay et retrouvée par M. Tillette de Clermont, n'est pas rare dans les dunes.

**Obione pedunculata** Moq.-Tand. (*Atriplex pedunculata* L. *Sp.* 1675; Boucher, *Cat. fl. d'Abbev.* [1803]; DC. *Fl. fr.* III, 385; Pauquy, *Fl. de la Somme*, 341). — Trépié près Étaples (Pas-de-Calais) : marais baignés par la mer, sur la rive gauche de la Canche près des phares. Je l'ai trouvé là pour la première fois le 13 août 1857, et je l'y ai revu en abondance le 2 octobre. La seule localité de cette espèce indiquée par Boucher en 1803 (et d'après lui par De Candolle et par Pauquy) est celle qui se trouve entre le Tréport et Mers (Somme). La plante y est encore, mais fort rare.

**Elymus arenarius** L. *Sp.* 122; Boucher, *Cat. fl. d'Abbev.* [1803]; Pauquy, *Fl. de la Somme*, 498; Gr. et Godr. *Fl. de Fr.* III, 597. — Cette Graminée existe à Boulogne, à l'endroit où les dunes de Capecure touchent à la jetée de l'ouest. Je l'ai revue plus abondante vers Vissant.

M. T. Puel rappelle que la présence de l'*Obione pedunculata*, aux environs de Calais, avait déjà été signalée par Steinheil; mais cette plante n'y avait pas été retrouvée depuis fort longtemps.

---

ERRATUM. — Page 904, ligne 31 : au lieu de trois plantes citées par M. Moquin-Tandon, lisez trois plantes de Magnol citées par M. Moquin-Tandon.